

FICHE ESPECE

n°14 février 2011

Le Lompe

Cyclopterus lumpus

Description :

Le lompe ou cycloptère peut atteindre 50 cm de long. Son corps massif et globuleux est dépourvu d'écailles, mais couvert de petites plaques osseuses et parcouru de rangées de gros tubercules osseux particulièrement visibles sur les flancs. La nageoire dorsale forme une crête chez l'adulte. Les nageoires pelviennes forment une ventouse permettant au lompe de se coller sur les rochers. La couleur varie du gris verdâtre à gris bleuté.

En période de reproduction, les mâles prennent des teintes plus vives : bleu foncé sur le dos et orange sur le ventre et les nageoires.



Un mâle lompe en période de reproduction

Distribution :

Le cycloptère vit en Atlantique nord, Baltique, Mer du Nord, et se rencontre également occasionnellement en Manche et plus au sud dans le Golfe de Gascogne jusqu'à de rares occurrences au nord du Portugal.



Juvénile

Habitat :

Cyclopterus lumpus vit la plupart du temps entre 50 m et 300 m de profondeur mais en période de reproduction, il remonte jusqu'en surface

Biologie :

De février à mai, les lompes viennent pondre sur le littoral et les mâles s'occupent des oeufs entre 6 à 7 semaines jusqu'à la naissance des petits.

