

FICHE ESPECE

n°4 Avril 2010

Araignée de mer Atlantique

Maja brachydactyla

Description :

La carapace, ovale et fortement bombée, mesure jusqu'à 25 cm de long et porte cinq fortes épines de chaque côté. La surface dorsale est garnie d'épines plus petites. La première paire de patte, plus large est lisse et munie de pinces. Les autres pattes sont plus fines et velues.

La coloration générale est rougeâtre hormis le dos qui peut être brunâtre ou verdâtre.



Une Araignée de mer à faible profondeur.

Distribution :

Considérée jusqu'en 2008 comme une sous-espèce de l'Araignée de mer Méditerranéenne (*Maja squinado*), l'Araignée de mer Atlantique vit en Atlantique (Açores, Canaries), en Manche et en Mer du Nord.

Habitat :

On trouve l'araignée de mer sur les fonds rocheux et parmi les algues, de la surface jusqu'à 50 mètres. Les jeunes affectionnent particulièrement les eaux moins profondes entre la surface et 20 mètres de profondeur.

Biologie :

L'Araignée de mer est opportuniste et se nourrit aussi bien d'algues, d'échinodermes, de crustacés, d'annélides, de mollusques et de poissons morts.

Mâles et femelles se regroupent en «tas» pour optimiser les chances de rencontre d'un partenaire. Chaque femelle pond une à trois fois par an, et chaque ponte compte jusqu'à 50.000 à 500.000 œufs. La ponte est portée par la femelle pendant toute la durée de l'incubation (environ 3 mois) et les éclosions ont lieu de juin à septembre.



www.fcmovie.fr